

癌化学療法輸液約束処方 胃11

入院用

癌種 胃癌 1.再発、切除不能（特に骨転移、DIC、経口不能例）

レジメン名 胃11 MTX + 5FU 中等量

薬品名（商品名）	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投薬時間	投与日	1コースの期間
メソトレキセート	メソトレキセート	MTX	80～100 mg/m ²	iv	静脈内注射	DAY 1, 8, 15	28日間
フルオロウラシル	フルオロウラシル	5FU	500～600 mg/m ²	div	60分	DAY 1, 8, 15	
ロイコボリン	ロイコボリンカルシウム	LV	15mg/body × 6	div	全開	DAY 2, 3, 9, 10, 16, 17 MTX投与終了24hr後より6hr毎に6回	

DAY 1, 8, 15

div

- 10:00 - 10:15 ① NS 50ml + デキサート 1V / 15分
 10:15 - 10:30 ② NS 50ml + グラニセトロン 1A / 15分
 10:30 - 12:30 ③ ソルデム1 500ml + 7%メイロン 40ml 1A / 120分
 12:30 - 14:30 ④ ソルデム1 500ml / 120分
 （側管）
 10:00 A. NS 10ml + ダイアモックス 250mg / iv 上記①
 10:30 B. 5%TZ 20ml + メソトレキセート mg / iv（医師施行） 上記③
 12:30 - 13:30 C. NS 100ml + フルオロウラシル mg / 60分 上記④
 13:30 D. NS 50ml / 5分（Cの直後）
 16:00 E. NS 10ml + ダイアモックス 250mg / iv 上記①開始より360分後に

Total 270分

DAY 2, 9, 16

div

- 11:00 ① NS 50ml + ロイコボリン 15mg / 5分
 17:00 ② = ① do
 23:00 ③ = ① do

DAY 3, 10, 17

div

- 5:00 ① NS 50ml + ロイコボリン 15mg / 5分
 11:00 ② = ① do
 17:00 ③ = ① do

