

## 癌化学療法輸液約束処方 胃16

癌種 胃癌 1.術後補助療法 2.再発、切除不能(特に骨転移 DIC)  
 レジメン名 胃16 MTX / 5FU 中等量

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路
メソトレキセート	メソトレキセート	MTX	80~100mg/m <sup>2</sup> (中等量)	div
フルオロウラシル	フルオロウラシル	5-FU	500~600mg/m <sup>2</sup>	div
ロイコボリン	ロイコボリンカルシウム	LV	45mg/day	po

div

- ① NS50ml+デキサート1V / 15分
- ② NS50ml+グラニセトロン1A / 15分
- ③ ソルデム1 500ml+7%メイロン20ml2A / 120分
- ④ ソルデム1 500ml / 120分

(側管)

- A NS10ml+ダイアモックス250mg iv 上記①
- B 5%Tz20ml+ メソトレキセート          mg iv Dr施行のこと
- C NS100ml+ フルオロウラシル          mg / 60分 上記
- D NS50ml / 5分 (Cの直後)

- Rp) 1. ダイアモックス(250)1Tab/1× D1T (当日15~16時)
2. ロイコボリン(5)9Tab/3× D1T (翌日の10時 16時 22時)
3. ナゼアOD(0.1)1Tab/1× D2T (翌日朝、翌々日朝)

3

経口不能例)

投薬期間	休薬期間	1クール期間
3週	1週	4週
3週	1週	4週
MTX投与翌日		

: 上記③

④

f)