

癌化学療法輸液約束処方 胃16

癌種 胃癌 入院用(短期)切除不能・進行再発胃癌

レジメン名 胃16 XEL+CDDP 高用量

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投薬期間	休薬期間	1クール期間
カペシタビン	カペシタビン	CAP	2000mg/m ²	po	2週(DAY1-14)	1週	21日
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	60mg/m ²	div	DAY1	2週	21日

div 化学療法前日

<メイン>

18:00-22:00 ①ソルデム3A 500ml / 240l
 22:00-翌日2:00 ②ソルデム3A 500ml / 240l
 翌日2:00-翌日7:00 ③ソルデム3A 500ml / 300l

div 化学療法当日

<メイン>

7:00-8:30 ①5% Tz 500ml + 10% NaCl 20ml 1A / 90min
 8:30-10:00 ②5% Tz 500ml + 10% NaCl 20ml 1A / 90min
 10:00-11:30 ③5% Tz 500ml + 10% NaCl 20ml 1A / 90min
 11:30-13:30 ④NS 400ml + シスプラチン mg / 120min
 13:30-15:00 ⑤5% Tz 500ml + 10% NaCl 20ml 1A / 90min
 15:00-16:30 ⑥5% Tz 500ml + 10% NaCl 20ml 1A / 90min
 16:30-18:00 ⑦5% Tz 500ml + 10% NaCl 20ml 1A / 90min
 18:00-22:00 ⑨ソルデム3A 500ml / 240min
 22:00-翌日2:00 ⑩ソルデム3A 500ml / 240min

<側管>

10:30-11:00 1) NS 100ml + デカドロン1.5V / 30min
 11:00-11:30 2) NS 50ml + アロキシ1V + アロカリス1V / 30min
 13:30 3) NS 50ml + フロセミド 1A / 5min

div 化学療法翌日

<メイン>

2:00-6:00 ①ソルデム3A 500ml / 240min
 6:00-10:00 ②ソルデム3A 500ml / 240min

<内服薬>

D2から内服 ②デカドロン錠4mg 2錠×3日間

【備考】

1. 化学療法当日、尿量に応じて利尿剤を追加する
2. 翌日退院を想定しているが、患者の状態によっては輸液の追加、退院の延期も可

