

癌化学療法輸液約束処方 胃21

癌種 胃癌 進行・再発
 レジメン名 胃21 SOX

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与方法	投与経路	投与日	1コースの期間
ティ・エス・ワン	ギメラシル・オテラシル・テガフル	TS-1	80 mg/m ²	分2 朝・夕食後	PO	DAY 1(夕)~15(朝) または DAY1(朝)~14(夕)	21日間
エルプラット	オキザリプラチン	L-OHP	130 mg/m ²	120分	末梢	DAY 1	

※実施決定後より内服開始

DAY 1

【末梢】

- ① 5% TZ 50ml + デキサート 1V / 5分
- ② 5% TZ 50ml + アロキシ 1V / 5分
- ③ 5% TZ 500 ml + エルプラット mg / 120分
- ④ 5% TZ 50ml / 5分

total. 135min

* 注意事項

- ① TS-1はDAY 1の夕食後より内服開始する。

【備考】

- ①海外でのREAL-2(L-OHP:130mg/m²)試験において、CDDPに対するL-OHPの非劣性が証明された。
- ②国内G-SOX試験では、SP療法に対するSOX(L-OHP:100mg/m²)療法の非劣性は検証されなかったため、L-OHPの投与量は130mg/m²が標準投与量となった。
- ③投薬基準や減量基準は、大腸癌SOFT試験を参照すること。

【投与開始基準】

- ①好中球: 1500/mm³以上
- ②血小板: 7.5万/mm³以上
- ③38°C以上の発熱を認めない
- ④感覚性神経障害: G2以下
- ⑤非血液毒性: G1以下

【減量基準】

- ①好中球: 500/mm³未満
- ②血小板: 7.5万/mm³未満
- ③発熱性好中球減少症: G3 以上

【TS-1の休薬基準】

- | | |
|---------|------------|
| 好中球 | 1000未満 |
| 血小板数 | 7.5万未満 |
| 血清Cre | 1.5mg/dL以上 |
| 感染 | 38°C以上の発熱 |
| 下痢 | Grade 2以上 |
| 粘膜炎/口内炎 | Grade 2以上 |

H27.2.19作成
R5.9.11改訂