

癌化学療法輸液約束処方 胃27

癌種 胃癌 再発・切除不能
 レジメン名 胃27 NIVO+SOX

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与方法	投与経路	投与日	1コースの期間
オプジーボ	ニボルマブ	NIVO	360mg/body	30分	DIV	DAY 1	21日間
ティ・エス・ワン	ギメラシル・オテラシル・テガフル	TS-1	80 mg/m ²	分2 朝・夕食後	PO	DAY 1(夕)~15(朝) または DAY1(朝)~14(夕)	
エルプラット	オキザリプラチン	L-OHP	130 mg/m ²	120分	DIV	DAY 1	

※実施決定後より内服開始

DAY 1

【末梢】

- ① NS 50ml /5分
- ② NS 100ml + **オプジーボ 360 mg** /30分 ☆フィルター使用
- ③ NS 50ml /5分
- ④ 5% TZ 50ml + デキサート 1V / 5分
- ⑤ 5% TZ 50ml + アロキシ 1V / 5分
- ⑥ 5% TZ 500 ml + **エルプラット mg** / 120分
- ⑦ 5% TZ 50ml / 5分

* 注意事項

- ① TS-1はDAY 1の夕食後より内服開始する。

【備考】

NIVOの休薬基準は共通NIVO参照

【SOX投与開始基準】

- ①好中球: 1500/mm³以上
- ②血小板: 7.5万/mm³以上
- ③38℃以上の発熱を認めない
- ④感覚性神経障害: G2以下
- ⑤非血液毒性: G1以下

【減量基準】

- ①好中球: 500/mm³未満
- ②血小板: 7.5万/mm³未満
- ③発熱性好中球減少症: G3 以上

好中球	1000未満
血小板数	7.5万未満
血清Cre	1.5mg/dL以上
感染	38℃以上の発熱
下痢	Grade 2以上
粘膜炎症/口内炎	Grade 2以上

R4.1.20作成
 R5.9.11改訂