

癌化学療法輸液約束処方 尿2

癌種 膀胱癌
 レジメン名 尿2 GEM + CBDCA(腎機能低下症例)

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投薬期間	休薬期間	1クール期間
ゲムシタビン	ゲムシタビン	GEM	1000 mg/m ²	div	DAY 1, 8, 15	1週	4週
カルボプラチン	カルボプラチン	CBDCA	AUC 5	div	DAY 1	3週	4週

DAY 1

- ① NS 50 ml + ファモチジン 1A + デキサート 2V / 5分
- ② NS 50 ml + アロキシ 1A / 5分
- ③ NS 100 ml + ゲムシタビン _____ mg / 30分 時間厳守
- ④ NS 250 ml + カルボプラチン _____ mg / 60分
- ⑤ NS 50 ml / 5分

DAY 8, 15

- ① NS 50 ml + デキサート 1V / 5分
- ② NS 50 ml + グラニセトロン 1A / 5分
- ③ NS 100 ml + ゲムシタビン _____ mg / 30分 時間厳守
- ④ NS 50 ml / 5分

【備考】 本レジメンは、GC療法の適応の患者で、腎機能が著しく悪い人に対し使用する。

2020.10.27 改訂