

## 癌化学療法輸液約束処方 胆道 2

癌種 胆道癌（外来・入院）  
レジメン名 胆道2 GCS

薬品名（商品名）	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与時間	投与日	1クール期間
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	25 mg/m <sup>2</sup>	div	1 時間	DAY 1	14日間
ゲムシタビン	ゲムシタビン塩酸塩	GEM	1000 mg/m <sup>2</sup>		30 分		
ティーエスワン	テガフル・ギメラシル・オテラシル	S1	80-120mg/body	内服	朝・夕食後	DAY 1(夕)-8(朝) または DAY1(朝)-7(夕)	

### メイン

- ① NS 500ml / 60分
- ② NS 500ml / 60分
- ③ NS 500ml / 60分

※実施決定後より内服開始

### 側管

- ①の側管より ① NS 100ml + デキサート 1V / 30分
- ①の側管より ② NS 100ml + アロキシ 1V / 30分
- ②の側管より ③ NS 250ml + シスプラチン \_\_\_\_\_ mg / 60分
- ③の側管より ④ NS 100ml + ゲムシタビン \_\_\_\_\_ mg / 30分
- ③の側管より ⑤ NS 100ml + フロセミド 0.5A / 30分

【GC休薬規定】 好中球数 < 1500、血小板数 < 10万、T-bli ≥ > .0、AST/ALT > 150、Cre > 1.2  
下痢・口内炎 ≥ Grade2

【S1休薬規定】 好中球数 < 1000、血小板数 < 7.5万、T-bli > 3.0、AST/ALT > 150  
下痢・口内炎 ≥ Grade2 非血液毒性 ≥ Grade3

【減量規定】 GEM: FN、好中球数 Grade4: 1000 → 800 → 600mg/m<sup>2</sup> → 以後20%ずつ減量

S1: 非血液毒性 ≥ Grade3: 1段階減量

CDDP: 減量なし 神経障害 ≥ Grade2 → 改善するまで延期

R2.11.13作成

R5.9.11 改訂