

癌化学療法輸液約束処方 多発性骨髄腫：MM7

癌種 再発・難治性多発性骨髄腫

レジメン名 MM7 Isa+Pd

薬品名 (商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与日	投与時間	1クール期間
サークリサ	イサツキシマブ	ISA	10mg/kg	div	1コース目：DAY1,8,15,22 2コース目以降：DAY1,15	別紙参照	28日間
ポマリスト	ポマリドミド	Pd	4mg/body	po	DAY1-21	-	
デキサメタゾン	デキサメタゾン	DEX	40mg/body (75歳以上は20mg/body)	divもし くはpo	DAY1,8,15,22	15分	

① NS 50ml + デキサート5V / 15分

(75歳以上はデキサート2.5V)

② NS 50ml + ファモチジン1V + ポララミン1A / 15分 アセトアミノフェン内服

③ NS 50ml / 5分

④ NS 250ml + **サークリサ** \_\_\_\_\_ mg / ※ ☆フィルター使用

⑤ NS 50ml / 5分

< 調整方法 >

サークリサは生食に希釈し全量を250mlに調製する

< 備考 >

※投与速度は体重によって変わる。段階的に速度を上げる。「サークリサ点滴速度 換算表」参照

① infusion reaction に注意 (投与速度とIR発現は相関する)。投与再開する場合も、「サークリサ点滴速度 換算表」を参照すること

②サークリサはフィルター (0.2μmのインラインフィルター：テルモ) 使用可能。

③アセトアミノフェン600mg内服

< 休薬・減量 >

Gr3以上の非血液毒性 Gr4の血液毒性

