

癌化学療法輸液約束処方 大13

癌種 大腸癌 再発・切除不能（通院外来用） インフューザーポンプ使用

レジメン名 大13 FOLFIRI / BV

薬品名（商品名）	一般名	略号	標準投与量	投与時間	投与経路	投与日	投与期間
レボホリナート	レボホリナートCa	I-LV	Ⓐ200mg/m ²	for2hr	末梢	DAY1	every 2week
アバスチン	ベバシズマブ	BV	5mg/kg(1st.交替療法)	1コース目:90分, 2コース目:60分	CVポート	DAY1	every 2week
				3コース目以降:30分			
イリノテカン	イリノテカン	CPT-11	Ⓑ150mg/m ²	for90分	CVポート	DAY1	every 2week
フルオロウラシル	フルオロウラシル	5-FU	Ⓒ400mg/m ²	bolus iv	CVポート	DAY1	every 2week
フルオロウラシル	フルオロウラシル	5-FU	Ⓓ1600~2400mg/m ²	for46hr	CVポート	DAY1~2	every 2week

【CVポート】

- ① NS 50ml / 5分
- ② NS 100ml+ アバスチン mg / (1コース目:90分, 2コース目:60分, 3コース目以降:30分)
- ③ NS50ml+デキサート1V / 5分
- ④ NS50ml+グラニセトロン 1A / 5分
- ⑤ NS500ml+ イリノテカン Ⓑ mg / 90分 (同時divあり)
- ⑥ NS50ml / 30分
- ⑦ NS50ml+ フルオロウラシル Ⓒ mg / 5分

⑧ フルオロウラシル Ⓓ mg } 計 ml / 46hr ニプロ シュアーフューザー使用

NS ml } 終了時 NS 20ml でフラッシュ

SFS-1002D(100ml用)
SFS-5-25(250ml用)

【末梢】

- ⑤と同時
- { 5%TZ250ml+ レボホリナート Ⓐ mg / 120分
- NS50ml / 5分