

# 癌化学療法輸液約束処方 大17

癌種 大腸癌 再発・切除不能（通院外来用）

レジメン名 大17 CPT-11 biw + C225

薬品名（商品名）	一般名	略号	標準投与量	投与時間	投与経路	投与日
イリノテカン	イリノテカン	CPT-11	150 mg/m <sup>2</sup> (100mg/m <sup>2</sup> まで減量可)	90分	CVポート	DAY 1, 15, 29
アービタックス	セツキシマブ	C225	400 mg/m <sup>2</sup> (1回目)	120分	または 末梢	DAY 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43
			250 mg/m <sup>2</sup> (2回目以降)	60分		

## DAY 1 (1回目は入院)

### 【 CVポート or 末梢 】

- ① NS 50ml + ポララミン 1A / 15分
- ② NS 50ml + デキサート 2V / 15分
- ③ NS 500ml + アービタックス            mg / 120分

※2回目以降は NS 250ml に希釈し 60分 投与

- ④ NS 50ml / 10分 ラインフラッシュ
- ⑤ NS 100ml / 60分 経過観察
- ⑥ NS 50ml + グラニセトロン 1A / 5分
- ⑦ NS 50ml + ブチルスコポラミン 1A / 5分
- ⑧ 5%TZ 500ml + イリノテカン            mg / 90分
- ⑨ NS 50ml / 5分

## DAY 15, 29 (2回目以降、変更点のみ)

### 【 CVポート or 末梢 】

- ③' NS 250ml + アービタックス            mg

## DAY 8, 22, 36, 43 (2回目以降、アービタッ

### 【 CVポート or 末梢 】

- ① NS 50ml + ポララミン 1A / 15分
- ② NS 50ml + デキサート 2V / 15分
- ③' NS 250ml + アービタックス            mg
- ④ NS 50ml / 10分 ラインフラッシュ
- ⑤ NS 100ml / 60分 経過観察



1コースの期間
49日間

／ 60分

クス単独)

／ 60分

H21.7.1改訂