

## 癌化学療法輸液約束処方 大19

癌種 大腸癌（高度進行直腸癌、主として術前化学療法）

レジメン名 大19 S1 + CPT-11 + RT

薬品名（商品名）	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与時間	投与日	1コースの期間
ティーエスワン	テガフルギメラシルオテラシルK	S1	80 mg/m <sup>2</sup>	po	-	DAY 1-5, 8-12, 22-26, 29-33	35日間
イリノテカン	イリノテカン	CPT-11	60 mg/m <sup>2</sup>	div	90分	DAY 1, 8, 22, 29	
放射線	-	-	1.8 Gy/day	-	-	5 days/week, 5 weeks. 計45Gy	

※実施決定後より内服開始

### DAY 1, 8, 22, 29

div

- ① NS 50ml + デキサート 1V / 5分
- ② NS 50ml + グラニセトロン 1V / 5分
- ③ NS 50ml + ブチルスコポラミン 1A / 5分
- ④ NS 500ml + イリノテカン          mg / 90分
- ⑤ NS 50ml / 5分

〈注意〉 化学療法当日(オプションで服用)

- ① アルカリ水服用(ボルビック)
- ② 腸管アルカリ化 Rp. 炭酸水素ナトリウム1.5g / 3 × D1T, ウルソサン(50) 3T / 3 × D1T

H21.7.1改訂

R5.9.11改訂

|