

癌化学療法輸液約束処方 大25

癌種 大腸癌 再発・切除不能（外来・入院用） インフューザーポンプ使用

レジメン名 大25 SLV5FU2 + C225

薬品名（商品名）	一般名	略号	標準投与量	投与時間	投与経路	投与日	1コースの期間
アービタックス	セツキシマブ	C225	250 mg/m ²	60min	CVポート	DAY 1, 8	14日間
レボホリナート	レボホリナートCa	I-LV	200 mg/m ²	120min		DAY 1	
フルオロウラシル	フルオロウラシル	5FU	400 mg/m ²	bolus iv			
			1600~2400 mg/m ²	46hr civ			

[DAY 1]

【 CVポート 】

- ① NS 50ml + ポララミン 1A / 15分
- ② NS 50ml + デキサート 2V + グラニセトロン 1A / 15分
- ③ NS 250ml + アービタックス _____ mg / 60分
- ④ NS 50ml / 10分 ラインフラッシュ
- ⑤ NS 100ml / 60分 経過観察
- ⑥ 5%TZ 250ml + レボホリナート _____ mg / 120分
- ⑦ NS 50ml + フルオロウラシル _____ mg / 5分
- ⑧ NS _____ ml + フルオロウラシル _____ mg / 計 _____ ml / 46hr civ
 ※ニプロシユアフューザー使用: SFS-1002D (100ml用)、SFS-5-25 (250ml用)
- ⑨ NS 20ml / シユアフューザー終了時フラッシュ

Total 285min

[DAY 8]

【 CVポート 】

- ① NS 50ml + ポララミン 1A / 15分
- ② NS 50ml + デキサート 2V / 15分
- ③ NS 250ml + アービタックス _____ mg / 60分
- ④ NS 50ml / 10分 ラインフラッシュ
- ⑤ NS 100ml / 60分 経過観察

Total 160min

<備考>

- ① 本レジメンでの単独治療はない。
- ② mFOLFOX6 + C225併用療法(1次治療)で、知覚性末梢神経障害の予防のみに一時的に施行すること。