

癌化学療法輸液約束処方 大27

癌種 大腸癌 再発・切除不能（通院外来用）

レジメン名 大27 XELIRI

薬品名（商品名）	一般名	略号	標準投与量	投与方法	投与経路	投与日	1コースの期間
カペシタビン	カペシタビン	XEL	1600～2000mg/m ²	分2 朝・夕食後	PO	DAY 1(夕)～15(朝) または DAY 1(朝)～14(夕)	21日間
イリノテカン	イリノテカン	CPT-11	150 mg/m ²	90min	CVポートor 末梢	DAY 1	

※実施決定後より内服開始

DAY 1

【 CVポートor末梢 】

- ① NS 50ml + デキサート 1V / 5分
- ② NS 50ml + アロキシ 1V / 5分
- ③ NS 500 ml + イリノテカン _____ mg / 90分
- ④ NS 50ml / 5分

total. 105min

* 注意事項

- ① カペシタビンはDAY 1の夕食後より内服開始する。
- ② カペシタビンハンドブック(服薬手帳)に内服期間を記入し、残数を管理する。
- ③ 術後補助化学療法とカペシタビンの投与量が異なる。
- ④ XELIRI療法の用法・用量、休薬・減量・再開については別紙参照とする。
- ⑤ CPT-11の投与量は添付文書に準ずるものとする(エビデンスは200mg/m²)

H27.6.15改訂

R5.9.11改訂