

# 癌化学療法輸液約束処方 大28

癌種 大腸癌 再発・切除不能（通院外来用）

レジメン名 大28 XELIRI + BV

薬品名（商品名）	一般名	略号	標準投与量	投与方法	投与経路	投与日	1コースの期間
アバスタチン	ベバシズマブ	BV	7.5 mg/kg	1コース目：90min	末梢 or CVポート	DAY 1	21日間
				2コース目：60min			
				3コース目以降：30min			
イリノテカン	イリノテカン	CPT-11	150 mg/m <sup>2</sup>	90min			
カペシタビン	カペシタビン	XEL	1600～2000 mg/m <sup>2</sup>	分2 朝・夕食後	PO	DAY 1(夕)～15(朝) または DAY 1(朝)～14(夕)	

※実施決定後より内服開始

## DAY 1

### 【 末梢orCVポート 】

- ① NS 50ml / 5min
  - ② NS 100ml + アバスタチン \_\_\_\_\_ mg / ( 1コース目：90min、2コース目：60min、3コース目以降：30min )
  - ③ NS 50ml / 5min
  - ④ NS 50ml + デキサート 1V / 5min
  - ⑤ NS 50ml + グラニセトロン 1A / 5min
  - ⑥ NS 500ml + イリノテカン \_\_\_\_\_ mg / 90min
  - ⑦ NS 50ml / 5min
- total. 145min～205min

### \* 注意事項

- ① カペシタビンはDAY 1の夕食後より内服開始する。
- ② カペシタビンハンドブック(服薬手帳)に内服期間を記入し、残数を管理する。
- ③ 術後補助化学療法とカペシタビンの投与量が異なる。
- ④ XELIRI + BV療法の用法・用量、休薬・減量・再開については別紙参照とする。
- ⑤ CPT-11の投与量は添付文書に準ずるものとする(エビデンスは200mg/m<sup>2</sup>)。

H28.1.18改訂

H30.11.26改訂

R5.9.11改訂