

# 癌化学療法輸液約束処方 大33

癌種 大腸癌 再発・切除不能（通院外来用）

レジメン名 大33 SOX + Bv

薬品名（商品名）	一般名	略号	標準投与量	投与方法	投与経路	投与日	1コースの期間
ティ・エス・ワン	ギメラシル・オテラシル・テガフル	TS-1	80 mg/m <sup>2</sup>	分2 朝・夕食後	PO	DAY 1(夕)～15(朝) または DAY1(朝)～14(夕)	21日間
エルプラット	オキザリプラチン	L-OHP	130 mg/m <sup>2</sup>	120分	CVポートor 末梢	DAY 1	
アバスチン	ベバシヅマブ	Bv	7.5mg/kg	1コース目：90分 2コース目：60分 3コース目以降：30分	CVポートor 末梢	DAY 1	

※実施決定後より内服開始

## DAY 1

### 【 CVポートor末梢 】

- ① NS 50ml / 5分
- ② NS 100ml + アバスチン mg / 1コース目90分、2コース目60分、3コース目以降30分
- ③ NS 50ml + デキサート 1V / 5分
- ④ 5% TZ 50ml + アロキシ1V / 5分
- ⑤ 5% TZ 500 ml + エルプラット mg / 120分
- ⑥ 5% TZ 50ml / 5分
- ⑦ NS 20ml / フラッシュ (末梢投与時不要)

total.110min～230min

## \*注意事項

- ① TS-1はDAY 1の夕食後より内服開始する。

## 【備考】

- ①日本で一番使用されているmFOLFOX6+Bvと SOX+Bvとの非劣性がSOFT試験により証明されている。  
SOX+Bvは大腸癌一次治療の選択肢の1つである。
- ②総コース数の制限：なし。

## 【TS-1の休薬基準】

好中球	1000未満
血小板数	7.5万未満
血清Cre	1.5mg/dL以上
感染	38℃以上の発熱
下痢	Grade 2以上
粘膜炎/口内炎	Grade 2以上

H28.1.18改訂

R5.9.11改訂

