

癌化学療法輸液約束処方 大34

癌種 大腸癌 再発・切除不能（通院外来用）

レジメン名 大34 IRIS + Bv

薬品名（商品名）	一般名	略号	標準投与量	投与方法	投与経路	投与日	1コースの期間
ティ・エス・ワン	ギメラシル・オテラシル・テガフル	TS-1	80 mg/m ²	分2 朝・夕食後	PO	DAY 1(夕)～15(朝) または DAY1(朝)～14(夕)	28日間
イリノテカン	塩酸イリノテカン	CPT-11	100 mg/m ²	90分	CVポートor 末梢	DAY 1, 15	
アバスチン	ベバシツマブ	Bv	5mg/kg	1コース目DAY1:90分 DAY15:60分 2コース目以降:30分	CVポートor 末梢	DAY 1, 15	

※実施決定後より内服開始

DAY 1,15

【 CVポートor末梢 】

- ① NS 50ml / 5分
- ② NS 100ml + アバスチン mg / 1コース目DAY1:90分、DAY15:60分、2コース目以降30分
- ③ NS 50ml + デキサート 1V / 5分
- ④ NS 50ml + アロキシ1V / 5分
- ⑤ NS 500 ml + イリノテカン mg / 90分
- ⑥ NS 50ml / 5分

【備考】

- ① IRIS 療法は FIRIS 試験により FOLFIRI との非劣性が証明されている。
当レジメンは、IRIS 療法にアバスチンを併用することで更なる延命を期待したレジメンである。
- ② 総コース数の制限:なし。

* 注意事項

- ① TS-1はDAY 1の夕食後より内服開始する。

【TS-1の休薬基準】

好中球 1000未満
 血小板数 7.5万未満
 血清Cre 1.5mg/dL以上
 感染 38°C以上の発熱
 下痢 Grade 2以上
 粘膜炎/口内炎 Grade 2以上

H28.1.18改訂

R5.9.11改訂