

# 癌化学療法輸液約束処方 大41

癌種 大腸癌 再発・切除不能（通院外来用） インフューザーポンプ使用

レジメン名 大41 mFOLFOXIRI + BV

薬品名 (商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与時間	投与経路	投与日	投与期間
レボホリナート	レボホリナートCa	I-LV	200mg/m <sup>2</sup>	120分	末梢	DAY1	2週間
アバステン	ベバシズマブ	BV	5mg/kg	1コース目:90分, 2コース目:60分	CVポート	DAY1	
				3コース目以降:30分			
イリノテカン	イリノテカン	CPT-11	150mg/m <sup>2</sup>	90分	CVポート	DAY1	
エルプラット	オキサリプラチン	L-OHP	85mg/m <sup>2</sup>	120分	CVポート	DAY2	
フルオロウラシル	フルオロウラシル	5-FU	2400mg/m <sup>2</sup>	46時間	CVポート	DAY1~2	

## 【CVポート】

- ① NS 50ml / 5分
- ② NS 100ml + アバステン mg / (1コース目:90分, 2コース目:60分, 3コース目以降:30分)
- ③ NS 50ml / 5分
- ④ NS100ml + デキサート 1.5V + アロキシ 1V + ブチルスコポラミン1A + アロカリス1V / 30分
- ⑤ 5%TZ500ml + イリノテカン mg / 90分
- ⑥ 5%TZ250ml + エルプラット mg / 120分 (同時divあり)

⑦ 5%TZ50ml / 5分

⑧ フルオロウラシル mg

SFS-1002D (100ml用)

NS ml 計 ml / 46hr ニプロ シュアーフューザー使用

終了時 NS 20ml でフラッシュ

SFS-5-25 (250ml用)

## 【末梢】

⑥と同時

5%TZ250ml + レボホリナート mg / 120分

5%TZ50ml / 5分

【休薬基準・減量基準】 Grade3以上の血液毒性、非血液毒性

【備考】コース制限:12コースまで→維持療法(大42)へ移行 支持療法:Day2-4 デカドロン錠4mg内服

R3.4.22改訂