

## 癌化学療法輸液約束処方 大42

癌種 大腸癌 再発・切除不能（通院外来用） インフューザーポンプ使用

レジメン名 大42 5FU +I-LV + BV(維持療法)

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与時間	投与経路	投与日	投与期間
レボホリナート	レボホリナートCa	I-LV	200mg/m <sup>2</sup>	120分	末梢	DAY1	2週間
アバスタチン	ベバシズマブ	BV	5mg/kg	1コース目:90分, 2コース目:60分	CVポート	DAY1	
				3コース目以降:30分			
5-FU	フルオロウラシル	5-FU	2400mg/m <sup>2</sup>	46時間	CVポート	DAY1~2	

### 【CVポート】

- ① NS 50ml / 5分
- ② NS 100ml + アバスタチン          mg / (1コース目:90分, 2コース目:60分, 3コース目以降:30分)
- ③ NS 50ml / 5分
- ④ NS100ml + デキサート1V + グラニセトロン1A / 30分
- ⑤ 5%TZ250ml + レボホリナート          mg / 120分
- ⑥ 5%TZ50ml / 5分
- ⑦ フルオロウラシル          mg  
NS          ml } 計          ml / 46hr      ニプロ シュアーフューザー使用  
 終了時 NS 20ml でフラッシュ

SFS-1002D(100ml用)  
SFS-5-25(250ml用)

【備考】大41後の維持療法

R2.4.13 作成