

癌化学療法輸液約束処方 呼9

癌種

非小細胞肺癌(StageⅢB/Ⅳ) (入院)

制吐薬要注意

レジメン名

呼9 CDDP + GEM

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与日	1クール期間
ゲムシタビン	塩酸ゲムシタビン	GEM	1000 mg/m ²	div	DAY 1, 8	21日間
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	80 mg/m ²	div	DAY 1	

[DAY 1]

- ① NS 500ml / 90分
- ② NS 500ml / 90分
- ③ NS 50ml + デキサート 2V / 15分、②の側管から
- ④ NS 50ml + アロキシ 1V + アロカリス 1V / 30分、②の側管から
- ⑤ NS 100ml + ゲムシタビン _____ mg / 30分、②の側管から
- ⑥ NS 50ml / 5分、②の側管から
- ⑦ NS 300ml + シスプラチン _____ mg / 90分
- ⑧ マンニトール20% 300ml / 60分
- ⑨ NS 500ml / 90分
- ⑩ ソルデム3A 500ml + メクロプラミド 1A / 90分
- ⑪ NS 50ml + フロセミド 1A / 15分、⑩の側管から
- ⑫ ソルデム3A 500ml + メクロプラミド 1A / 90分

[DAY 2, 3]

- ① NS 500ml / 90分
- ② NS 50ml + デキサート 1V / 15分、①の側管から
- ③ ソルデム3A 500ml + メクロプラミド 1A / 90分
- ④ ソルデム3A 500ml + メクロプラミド 1A / 90分

[DAY 8]

- ① NS 500ml / 90分
- ② NS 50ml + デキサート 1V / 15分、①の側管から
- ③ NS 50ml + グラニセトロン 1A / 15分、①の側管から
- ④ NS 100ml + ゲムシタビン _____ mg / 30分、①の側管から
- ⑤ NS 50ml / 5分、①の側管から

[備考]

DAY 1, Rp⑦の生理食塩水は500mlから200mlを破棄して使用する。

R4.12.2改訂

