

癌化学療法輸液約束処方 呼 15

癌種 非小細胞肺癌(StageⅢB/Ⅳ) (外来・入院)
 レジメン名 呼15 CBDCA + Pem

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与日	1クール期間
アリムタ	ペメトレキセドナトリウム水和物	Pem	500 mg/m ²	div	DAY 1	21日間
カルボプラチン	カルボプラチン	CBDCA	AUC 5	div	DAY 1	

[DAY 1]

- ① NS 100ml + デキサート 1V + アロキシ 1A + アロカリス1V / 30分
- ② NS 100ml + アリムタ _____ mg / 10分
- ③ NS 100ml / 30分
- ④ 5%Tz 250ml + カルボプラチン _____ mg / 60分
- ⑤ NS 100ml / 10分

[備考]

アリムタ投与7日以上前から、パンビタン末1.0gを連日経口投与。投与終了後22日まで。(添付文書)

アリムタ投与7日以上前にビタミンB12 1.0mgを筋肉内注射し、アリムタ治療中は9週毎にくり返す。(添付文書)

実臨床においては、パンビタン(葉酸)及びVB12の投与はアリムタ投与日まで(投与当日開始も可)に開始すれば可とする。

投与期間中は必須。(H28.5.13の院内化学療法委員会にて承認)

R5.12.18改訂