

## 癌化学療法輸液約束処方 呼48

癌種 非小細胞肺癌(StageⅢB/Ⅳ)(扁平上皮癌) (外来・入院)

レジメン名 呼48 CBDCA + nabPTX + PEMBRO

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与時間	投与日	1クール期間
アブラキサン	アルブミン懸濁型パクリタキセル	nabPTX	100 mg/m <sup>2</sup>	div	30分	DAY 1,8	21日間
カルボプラチン	カルボプラチン	CBDCA	AUC 5~6	div	30分	DAY 1	
キイトルーダ	ペムブロリズマブ	PEMBRO	200 mg/body	div	30分		

### [ DAY 1 ]

- ① NS 50ml / 5分
- ② NS 100ml + キイトルーダ 200 mg / 30分 ☆フィルター使用
- ③ NS 50ml / 5分

Rp3終了後、側管から投与開始

- ④ NS 100ml + デキサート 1V + アロキシ 1V + アロカリス 1V / 30分
- ⑤ NS 50ml / 5分
- ⑥ NS 50ml + アブラキサン mg / 30分 ★フィルター不可
- ⑦ NS 50ml / 5分
- ⑧ NS 250ml + カルボプラチン mg / 30分
- ⑨ NS 50ml / 5分

### [ DAY 8 ]

- ① NS 50ml + デキサート 1V + グラニセトロン 1A / 30分
- ② NS 50ml / 5分
- ③ NS 50ml + アブラキサン mg / 30分 ★フィルター不可
- ④ NS 50ml / 5分

### [ 備考 ]

- ① 4コースまで
- ② キイトルーダはフィルター使用 Rp4からはフィルターなしで側管より投与開始
- ③ アブラキサンは、最終濃度:5mg/mlに調製すること。フィルターなし、他剤との配合は不可。  
アルブミン製剤のため、製造番号を確認すること。投与時、患者の同意書が必要。
- ④ 休薬基準:Gr3以上の非血液毒性 減量基準:Gr4の好中球減少 5日以上 Gr4以上の血小板減少