

癌化学療法輸液約束処方 呼 49

癌種 非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）
 レジメン名 呼49 CBDCA+PTX+Bev+ATEZO

薬品名（商品名）	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与日	1クール期間
パクリタキセル	パクリタキセル	PTX	175 mg/m ²	div	DAY 1	21日間
カルボプラチン	カルボプラチン	CBDCA	AUC 5~6	div	DAY 1	
アバスチン	ベバシズマブ	Bev	15 mg/kg	div	DAY 1	
テセントリク	アテゾリズマブ	ATEZO	1200 mg/body	div	DAY 1	

[DAY 1]

- ① NS 50ml / 5分
- ② NS 250ml + テセントリク 1200 mg / 1コース目60分 2コース目以降30分
- ③ NS 50ml / 5分
- ④ NS 100ml + アバスチン _____ mg / 1コース目90分 2コース目60分 3コース目以降30分
- ⑤ NS 50ml + デキサート 24mg + ファモチジン 1V / 5分 ☆投与開始時 レスタミン錠50mg内服
- ⑥ NS 50ml + アロキシ 1V + アロカリス1V / 30分
- ⑦ NS 500ml + パクリタキセル _____ mg / 180分
- ⑧ NS 250ml + カルボプラチン _____ mg / 30分
- ⑨ NS 50 ml / 5分

[備考] ① 6コースまで

- ② テセントリクの投与基準などは呼40を参照。
- ③ インラインフィルターを使用。
- ④ アバスチン、テセントリクの投与時間はコース数により異なる。主治医判断により変更可能。
- ⑤ 休薬基準：Gr3以上の非血液毒性 減量基準：Gr4の好中球減少 5日以上 Gr4以上の血小板減少