癌化学療法輸液約束処方 呼 51

癌種

進展型小細胞肺癌 (外来・入院)

レジメン名

呼51 CBDCA + VP-16 + ATEZO

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与日	1クール期間
エトポシド	エトポシド	VP-16	100 mg/m^2	div	DAY 1, 2, 3	
カルボプラチン	カルボプラチン	CBDCA	AUC 5	div	DAY 1	21日間
テセントリク	アテゾリズマブ	ATEZO	1200 mg/body	div	DAY 1	

[DAY 1]

[DAY 2, 3]

① NS 50ml / 5分

- ① NS 50ml + デカドロン0.5V / 15分
- ② NS 250ml + <u>テセントリク 1200 mg</u> / 1コース目60分 2コース目以降3(② 5%Tz 500ml + <u>エトポシド mg</u> / 90分 ☆フィルター使用 ☆フィルター不可
- ③ NS 50ml / 5分

③ NS 50ml / 5分 フラッシュ

- <③終了後、側①開始>
- 側① NS 100ml + デカドロン1V + アロキシ 1V + アロカリス1V / 30分
- 側② 5%Tz 500ml + <u>エトポシド mg</u> / 90分 ☆フィルター不可
- 側③ NS 250ml + <u>カルボプラチン</u> mg / 60分
- 側④ NS 50ml / 5分 フラッシュ

[備考]

- 1 4-6コース
- ② DEHPを含まない点滴セットを使用する。DAY1:メインはフィルターあり、側管はフィルターなし
- ③ ポリカーボネート製の三方活栓は使用不可
- ④ 休薬規定 Grade3以上の骨髄抑制、非血液毒性 減量規定 Grade4の骨髄抑制、Grade3以上の非血液毒性

R5.12.18改訂