

癌化学療法輸液約束処方 呼52

癌種 肺癌(Stage III B/IV)(非扁平上皮癌/非小細胞肺癌) (外来・入院)

レジメン名 呼52 CBDCA + nabPTX + ATEZO

| 薬品名(商品名) | 一般名 | 略号 | 標準投与量 | 投与経路 | 投与時間 | 投与日 | 1クール期間 |
|----------|-----------------|--------|-----------------------|------|-------------|---------|--------|
| アブラキサン | アルブミン懸濁型パクリタキセル | nabPTX | 100 mg/m ² | div | 30分 | DAY 1,8 | 21日間 |
| カルボプラチン | カルボプラチン | CBDCA | AUC 5~6 | div | 30分 | DAY 1 | |
| テセントリク | アテゾリズマブ | ATEZO | 1200 mg/body | div | 初回60分 以降30分 | | |

[DAY 1]

- ① NS 50ml / 5分
- ② NS 250ml + テセントリク 1200 mg / 初回60分 2回目以降30分

☆フィルター使用

- ③ NS 50ml / 5分

Rp3終了後、側管から投与開始

- ④ NS 100ml + デキサート 1V + アロキシ 1V + アロカリス1V / 30分
- ⑤ NS 50ml / 5分
- ⑥ NS 50ml + アブラキサン mg / 30分 ★フィルター不可
- ⑦ NS 50ml / 5分
- ⑧ NS 250ml + カルボプラチン mg / 30分
- ⑨ NS 50ml / 5分

[DAY 8]

- ① NS 50ml + デキサート 1V + グラニセトロン 1A / 30分
- ② NS 50ml / 5分
- ③ NS 50ml + アブラキサン mg / 30分 ★フィルター不可
- ④ NS 50ml / 5分

[備考]

- ① 6コースまで
- ② テセントリクはフィルター使用 Rp4からはフィルターなしで側管より投与開始
- ③ アブラキサンは、最終濃度:5mg/mlに調製すること。フィルターなし、他剤との配合は不可。
アルブミン製剤のため、製造番号を確認すること。投与時、患者の同意書が必要。
- ④ 休薬基準:Gr3以上の非血液毒性 減量基準:Gr4の好中球減少 5日以上 Gr4以上の血小板減少 Gr3の非血液毒性