

癌化学療法輸液約束処方 呼 54

癌種 非小細胞肺癌(Stage III B/IV)(非扁平上皮癌) (外来・入院)
 レジメン名 呼54 CBDCA + PEM + ATEZO

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与日	1クール期間
アリムタ	ペメトレキセド	PEM	500 mg/m ²	div	DAY 1	21日間
カルボプラチン	カルボプラチン	CBDCA	AUC 5~6	div		
テセントリク	アテゾリズマブ	ATEZO	1200 mg/body	div		

[DAY 1]

- ① NS 50ml / 5分
- ② NS 250ml + テセントリク 1200 mg / 1コース60分 2コース目以降30分 ☆インラインフィルター付
- ③ NS 50ml / 5分
- ④ NS 100ml + デキサート1V + アロキシ 1V + アロカリス1V / 30分
- ⑤ NS 100ml + アリムタ _____ mg / 10分
- ⑥ NS 100ml / 30分
- ⑦ NS 250ml + カルボプラチン _____ mg / 30分
- ⑧ NS 50ml / 5分

[備考]

- ① 6コースまで
- ② アリムタ投与7日以上前から、パナビタン末1.0gを連日経口投与。投与終了後22日まで。(添付文書)
- ③ アリムタ投与7日以上前にビタミンB12 1.0mgを筋肉内注射し、アリムタ治療中は9週毎にくり返す。(添付文書)
- ④ 実臨床においては、パナビタン(葉酸)及びVB12の投与はアリムタ投与日まで(当日開始も可)に開始すれば可とする。
- ⑤ 休薬基準: Gr3以上の非血液毒性 減量基準: Gr4の好中球減少 5日以上 Gr4以上の血小板減少
- ⑥ ATEZOの投与基準などは呼40を参照