

癌化学療法輸液約束処方 呼57

癌種 小細胞肺癌
レジメン名 呼57 CDDP + VP-16 + DUL

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与日	1クール期間
エトポシド	エトポシド	VP-16	80-100 mg/m ²	div	DAY 1, 2, 3	21日間
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	75-80 mg/m ²	div	DAY 1	
イミフィンジ	デュルバルマブ	DUL	1500 mg/body	div	DAY 1	

[DAY 1]

- ① NS 50ml / 5分
- ② NS100ml + イミフィンジ 1500 mg / 60分 ☆フィルターあり
- ③ NS 50ml / 5分

<③終了後、側①開始>

- 側① NS 500ml + マグネゾール 20ml / 90分
- 側② NS 50ml + デキサート 2V / 15分
- 側③ NS 50ml + アロキシ 1V + アロカリス 1V / 30分
- 側③ 5%Tz 500ml + エトポシド mg / 90分
- 側④ NS 300ml + シスプラチン mg / 90分 ☆フィルターなし
- 側⑤ マンニトール300ml / 60分
- 側⑥ NS 500ml / 90分
- 側⑦ ソルデム3A 500ml / 90分

[備考]

- ① 4コース(最大6コース)
- ② DEHPを含まない点滴セットを使用する。DAY1:メインはフィルターあり、側管はフィルターなし
- ③ 休薬規定 Grade3以上の非血液毒性 減量規定 Grade4の好中球減少5日持続、血小板減少、好中球減少発熱
その他休薬基準は呼42参照
- ④ ポリカーボネート製の三方活栓は使用不可

[DAY 2, 3]

- ① NS 50ml + デキサート 0.5V / 15分
- ② 5%Tz 500ml + エトポシド mg / 90分
☆フィルターなし
- ③ ソルデム3A 500ml / 90分

R4.12.2改訂

