

癌化学療法輸液約束処方 呼61

癌種 扁平上皮肺癌  
 レジメン名 呼61 NIVO + CBDCA + GEM

制吐薬要注意

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与日	1クール期間
オプジーボ	ニボルマブ	NIVO	360 mg/body	div	DAY 1	21日間
ゲムシタビン	塩酸ゲムシタビン	GEM	1000 mg/m <sup>2</sup>	div	DAY 1, 8	
カルボプラチン	カルボプラチン	CBDCA	AUC 5	div	DAY 1	

[ DAY 1 ]

- ① NS 50ml / 5分
- ② NS 100ml + オプジーボ 360 mg / 30分 ☆フィルター使用
- ③ NS 100ml / 10分
- ④ NS 100ml + デキサート 1V + アロキシ1V + アロカリス1V / 30分
- ⑤ NS 50ml / 5分
- ⑥ NS 100ml + ゲムシタビン \_\_\_\_\_ mg / 30分
- ⑦ NS 100ml / 30分
- ⑧ NS 250ml + カルボプラチン \_\_\_\_\_ mg / 30分
- ⑨ NS 50ml / 30分

[ DAY 8 ]

- ① NS 100ml + デキサート 1V + グラニセトロン1V / 30分
- ② NS 100ml + ゲムシタビン \_\_\_\_\_ mg / 30分
- ③ NS 50ml / 5分

[ 備考 ]

呼33参照

[ 減量・休薬規定 ]

NIVO:呼33参照

CBDCA/GEM:休薬Grade3以上の非血液毒性  
 減量Grade4以上の血液毒性

R5.12.18改訂