

癌化学療法輸液約束処方 呼65

癌種 扁平上皮肺癌
 レジメン名 呼65 NIVO+IPI+CBDCA+PTX

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与時間	投与日	1クール期間
オプジーボ	ニボルマブ	NIVO	360 mg/body	div	30分	DAY 1,22	42日間
ヤーボイ	イピリムマブ	IPI	1 mg/kg	div	30分	DAY 1	
パクリタキセル	パクリタキセル	PTX	200 mg/m ²	div	180分	DAY 1,22	
カルボプラチン	カルボプラチン	CBDCA	AUC 6	div	30分	DAY 1,22	

[DAY 1]

- ① NS 50ml / 5分
- ② NS 100ml + オプジーボ 360 mg / 30分 ☆フィルター使用
- ③ NS 50ml / 5分
- ④ NS 50ml + ヤーボイ mg / 30分 最終液量30mLに調製
☆フィルター使用
- ⑤ NS 50ml / 5分
- ⑥ NS 50ml + デキサート 2V + ファモチジン 1V / 30分
- ⑦ NS 50ml + アロキシ 1V + アロカリス1V / 30分
- ⑧ NS 500ml + パクリタキセル mg / 180分 ☆フィルター使用
- ⑨ 5%Tz 250ml + カルボプラチン mg / 30分
- ⑩ NS 50ml / 5分

【注意事項】

- ・CBDCA+PTXはday1,22の2回まで
- ・アロキシ開始時にレスタミン錠50mg内服する
- ・ポリオキシエチレンヒマシ油のアレルギーに注意
- ・NIVO+IPIの投与基準は腎3参照
- ・休薬: Gr3以上の非血液毒性 Gr4の血液毒性 減量: Gr3以上の非血液毒性(神経障害はGr2以上) Gr4の血液毒性

[DAY 22]

- ① NS 50ml / 5分
- ② NS 100ml + オプジーボ 360 mg / 30分 ☆フィルター使用
- ③ NS 50ml / 5分
- ④ NS 50ml + デキサート 2V + ファモチジン 1V / 30分
- ⑤ NS 50ml + アロキシ 1V + アロカリス1V / 30分
- ⑥ NS 500ml + パクリタキセル mg / 180分
☆フィルター使用
- ⑦ 5%Tz 250ml + カルボプラチン mg / 30分
- ⑧ NS 50ml / 5分

R5.12.18改訂