

癌化学療法輸液約束処方 呼67

癌種 非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）
レジメン名 呼67 NIVO+IPI+CBDCA+PEM

薬品名（商品名）	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与時間	投与日	1クール期間
オプジーボ	ニボルマブ	NIVO	360 mg/body	div	30分	DAY 1,22	42日間
ヤーボイ	イピリムマブ	IPI	1 mg/kg	div	30分	DAY 1	
カルボプラチン	カルボプラチン	CBDCA	AUC 5	div	30分	DAY 1,22	
アリムタ	ペトレキセド	PEM	500 mg/m ²	div	10分	DAY 1,22	

[DAY 1]

- ① NS 50ml / 5分
- ② NS 100ml + オプジーボ 360 mg / 30分 ☆フィルター使用
- ③ NS 50ml / 5分
- ④ NS 50ml + ヤーボイ _____ mg / 30分 最終液量30mLに調製
☆フィルター使用
- ⑤ NS 50ml / 5分
- ⑥ NS 100ml + デキサート 1V + アロキシ 1V + アロカリス1V / 30分
- ⑦ NS 100ml + アリムタ _____ mg / 10分
- ⑧ NS 100ml / 30分
- ⑨ 5%Tz 250ml + カルボプラチン _____ mg / 30分
- ⑩ NS 50ml / 5分

【注意事項】

- ・CBDCA+PEMはday1,22の2回まで
- ・アリムタ投与7日以上前から、パンビタン末1.0gを連日経口投与。投与終了後22日まで。（添付文書）
- ・アリムタ投与7日以上前にビタミンB12 1.0mgを筋肉内注射し、アリムタ治療中は9週毎にくり返す。（添付文書）
- ・実臨床においては、パンビタン（葉酸）及びVB12の投与はアリムタ投与日まで（投与当日開始も可）に開始すれば可とする。
投与期間中は必須。（H28.5.13の院内化学療法委員会にて承認）
- ・NIVO+IPIの投与基準は腎3参照
- ・休薬：Gr3以上の非血液毒性 Gr4の血液毒性 減量：Gr3以上の非血液毒性 Gr4の血液毒性

[DAY 22]

- ① NS 50ml / 5分
- ② NS 100ml + オプジーボ 360 mg / 30分 ☆フィルター使用
- ③ NS 50ml / 5分
- ④ NS 100ml + デキサート 1V + アロキシ 1V + アロカリス1V / 30分
- ⑤ NS 100ml + アリムタ _____ mg / 10分
- ⑥ NS 100ml / 30分
- ⑦ 5%Tz 250ml + カルボプラチン _____ mg / 30分
- ⑧ NS 50ml / 5分