

癌化学療法輸液約束処方 呼72

癌種 切除不能な進行・再発の扁平上皮非小細胞肺癌

制吐薬要注意

レジメン名 呼72 Necitumumab + CDDP + GEM

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与日	1クール期間
ポートラーザ	ネシツムマブ	Necitumumab	800 mg/body	div	DAY 1, 8	21日間
ゲムシタビン	塩酸ゲムシタビン	GEM	1250 mg/m ²	div	DAY 1, 8	
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	75 mg/m ²	div	DAY 1	

[DAY 1]

- ① NS 50ml / 5分
- ② NS 200ml + ポートラーザ 800 mg / 60分
- ③ NS 500ml / 90分
- ④ NS 250ml + マグネゾール20ml /60分 イメンドカプセル内服
- ⑤ NS 100ml + デキサート 1V + アロキシ1V / 30分
- ⑥ NS 100ml + ゲムシタビン _____ mg / 30分
- ⑦ NS 100ml / 30分
- ⑧ NS 300ml + シスプラチン _____ mg / 120分
- ⑨ マンニトール20% 300ml / 60分
- ⑩ NS 500ml / 90分
- ⑪ NS 500ml / 90分

[備考]

呼9参照

CDDP/GEMの投与は4コースまで

infusion reaction Gr1発現時は投与速度50%減速

[DAY 8]

- ① NS 50ml / 5分
- ② NS 200ml + ポートラーザ 800 mg / 60分
- ③ NS 50ml / 5分
- ④ NS 250ml + マグネゾール20ml /60分
- ⑤ NS 100ml + デキサート 1V + グラニセトロン1V / 30分
- ⑥ NS 100ml + ゲムシタビン _____ mg / 30分
- ⑦ NS 50ml / 5分

[休薬規定]

Gr3以上の非血液毒性、血液毒性

[減量規定]

Gr3以上の非血液毒性、Gr4以上の血液毒性