

## 癌化学療法輸液約束処方 呼75

癌種 非扁平上皮非小細胞肺癌  
 レジメン名 呼75 CBDCA+PEM+DUL+Treme

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与時間	投与日	1クール期間
カルボプラチン	カルボプラチン	CBDCA	AUC 5	div	30分	DAY 1	21日間
アリムタ	ペメトレキセド	PEM	500 mg/m <sup>2</sup>	div	10分	DAY 1	
イミフィンジ	デュルバルマブ	DUL	1500 mg/body	div	60分	DAY 1	
イジユド	トレメリムマブ	Treme	75 mg/body	div	60分	DAY 1	

### [ DAY 1 ]

- ① NS 50ml / 5分
- ② NS 100ml + イミフィンジ 1500 mg / 60分 ☆フィルター使用
- ③ NS 50ml / 5分
- ④ NS 100ml + イジユド 75 mg / 60分 ☆フィルター使用
- ⑤ NS 50ml / 5分
- ⑥ NS 100ml + デキサート 1V + アロキシ 1V + アロカリス1V / 30分
- ⑦ NS 100ml + アリムタ \_\_\_\_\_ mg / 10分
- ⑧ NS 100ml / 30分
- ⑨ NS 250ml + カルボプラチン \_\_\_\_\_ mg / 30分
- ⑩ NS 50ml / 5分

### 【注意事項】

- ・4コースまで
- ・DULの投与基準は呼42参照
- ・休薬基準: Gr3以上の非血液毒性 減量基準: 骨髄抑制
- ・アリムタ投与7日以上前から、パンビタン末1.0gを連日経口投与。投与終了後22日まで。(添付文書)
- ・アリムタ投与7日以上前にビタミンB12 1.0mgを筋肉内注射し、アリムタ治療中は9週毎にくり返す。(添付文書)
- ・実臨床においては、パンビタン(葉酸)及びVB12の投与はアリムタ投与日まで(投与当日開始も可)に開始すれば可とする。  
 投与期間中は必須。(H28.5.13の院内化学療法委員会にて承認)

R5.12.18改訂