

癌化学療法輸液約束処方 呼 80

周術期投与期間要注意

癌種 非小細胞肺癌術前化学療法
レジメン名 呼80 NIVO + CBDCA + PTX

薬品名 (商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与日	1クール期間
オブジーボ	ニボルマブ	NIVO	360 mg/body	div	DAY 1	21日間
パクリタキセル	パクリタキセル	PTX	200 mg/m ²	div		
カルボプラチン	カルボプラチン	CBDCA	AUC 6	div		

[DAY 1]

- ① NS 50ml / 5分
- ② NS 100ml + オブジーボ mg / 30分
- ③ NS 50ml / 5分
- ④ NS 50ml + デキサート 3V + ファモチジン 1V / 30分
- ⑤ NS 50ml + アロキシ 1V + アロカリス1V / 30分
- ⑥ NS 500ml + パクリタキセル mg / 180分
- ⑦ NS 250ml + カルボプラチン mg / 30分
- ⑧ NS 50ml / 5分

[備考]

休薬基準: Gr3以上の非血液毒性 減量基準: 骨髄抑制 (NIVOの投与基準は呼33参照)

アロキシ開始時にレスタミン錠50mg内服する。

DEHPを含まない点滴セット、0.22ミクロン以下のインラインフィルター使用する。

ポリオキシエチレンヒマシ油のアレルギーに注意。

3コースまで

R5.12.18改訂