

【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

《無断転載禁止》

レジメン番号： RCC-115

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐リスク	根拠
腎細胞がん	Avelumab+ Axitinib	14日間	規定なし	<input checked="" type="checkbox"/> 進行/再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他	軽度	Morzer, R. J. et al.:N Engl J Med 380(12): 1103, 2019

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	レスタミン カロナール	50mg 600mg	内服 内服	①開始時															
①	生理食塩液	50mL	点滴静注	30分	↓														
②	バベンチオ 生理食塩液	10mg/kg 250mL	点滴静注	60分	↓														
③	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓														
	インライタ	10mg	内服	1日2回に分けて	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓

<注意事項/備考>

- ✓ Avelumab：0.2~1.2μmのインラインフィルターを用いて投与
- ✓ Infusion reaction 予防としてバベンチオ投与前にデジフェンヒドラミン50mg・アセトアミノフェン600mg内服
- ✓ Avelumab：IR対策として初回2時間、忍容性良好であれば2回目以降は1時間投与（当院取り決め）
- ✓ Axitinib：患者の状態により適宜増減、1回10mgを1日2回まで増量可

