

【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

《無断転載禁止》

レジメン番号： OVA-117

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐リスク	根拠
卵巣がん	Bv+DC	21日間	6コース+α	<input checked="" type="checkbox"/> 進行/再発 <input checked="" type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他	高/中	J Clin Oncol 21: 3194-3200, 2003 J Natl Cancer Inst 95: 1320-30, 2003

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
①	デキサート アロキシ 生理食塩液	6.6mg 0.75mg 50mL	点滴静注	15分	↓																				
③	ドセタキセル 5%ブドウ糖液	75mg/m ² 250mL	点滴静注	60分	↓																				
④	カルボプラチン 5%ブドウ糖液	AUC 5 250mL	点滴静注	60分	↓																				
⑤	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																				
⑥	アバスチン* 生理食塩液	15mg/kg 100mL	点滴静注	初回 90分 2回目 60分 3回目~ 30分	↓																				
⑦	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																				
*Bvは2コース目（以降）から開始（術後の出血の影響を考慮し、初回はBv抜き）																									
＜維持療法＞ 下記2～6コース施行後、下記Bv単独療法を最大21サイクル施行可																									
①	アバスチン 生理食塩液	15mg/kg 100mL	点滴静注	30分	↓																				
②	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																				

＜注意事項/備考＞

- ✓ Bv：出血、創傷治癒遅延あり、原則として術後4週間は投与せず / 血圧上昇（高血圧）に注意（自宅での定期的な測定・記録を）
- ✓ Bv：初回90分、2回目60分、3回目以降30分かけて投与
- ✓ DOC：浮腫予防として、DEX 8mg/dayを2日間内服（day1夕～day3朝）の検討も
- ✓ CBDCA：投与回数を重ねると、ショック、アナフィラキシー様症状の発現頻度が高くなる傾向（8コース前後）
- ✓
- ✓