

【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

<<無断転載禁止>>

レジメン番号： OVA-119

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐リスク	根拠
卵巣がん (再発)	Bv + weekly PTX	28日間	規定なし	<input checked="" type="checkbox"/> 進行/再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他	軽度	J Clin Oncol 32: 1302-8, 2014

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	デキサート ファモチジン ポララミン 生理食塩液	6.6mg 20mg 5mg 50mL	点滴静注	30分	↓							↓											↓									
②	パクリタキセル 生理食塩液	80mg/m ² 250mL	点滴静注	60分	↓							↓											↓									
③	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓							↓											↓									
④	アバスチン* 生理食塩液	10mg/kg 100mL	点滴静注	初回 90分 2回目 60分 3回目～ 30分	↓																	↓										
⑤	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																		↓									

<注意事項/備考>

- ✓ PTX：0.2または0.22μmのインラインフィルターを用いて投与、DEHPを含まない輸液セット使用
- ✓ PTX：ポリオキシエチレンヒマシ油によるアレルギー発現に注意
- ✓ 末梢神経障害（PTX）：四肢の知覚異常が主体、疼痛を伴うこともあり
- ✓ Bv：出血、創傷治癒遅延あり、原則として術後4週間は投与せず / 血圧上昇（高血圧）に注意（自宅での定期的な測定・記録を）
- ✓ Bv：初回90分、2回目60分、3回目以降30分かけて投与
- ✓