

## 癌化学療法輸液約束処方 呼 46

癌種 非小細胞肺癌 (Stage III B/IV) (非扁平上皮癌) (外来・入院)  
 レジメン名 呼46 CBDCA + PEM + PEMBRO

薬品名 (商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与時間	投与日	1クール期間
アリムタ	ペメトレキセド	PEM	500 mg/m <sup>2</sup>	div	10分	DAY 1	21日間
カルボプラチン	カルボプラチン	CBDCA	AUC 5	div	30分		
キイトルーダ	ペムブロリズマブ	PEMBRO	200 mg/body	div	30分		

### [ DAY 1 ]

- ① NS 50ml / 5分
- ② NS 100ml + キイトルーダ 200 mg / 30分 ☆インラインフィルター使用
- ③ NS 50ml / 5分
- ④ NS 100ml + デキサート 1V + アロキシ 1V + アロカリス 1V / 30分
- ⑤ NS 100ml + アリムタ mg / 10分
- ⑥ NS 100ml / 30分
- ⑦ NS 250ml + カルボプラチン mg / 30分
- ⑧ NS 50ml / 10分

### [ 備考 ]

- ① 4コースまで
- ② アリムタ投与7日以上前から、パンビタン末1.0gを連日経口投与。投与終了後22日まで。(添付文書)
- ③ アリムタ投与7日以上前にビタミンB12 1.0mgを筋肉内注射し、アリムタ治療中は9週毎にくり返す。(添付文書)
- ④ 実臨床においては、パンビタン(葉酸)及びVB12の投与はアリムタ投与日まで(当日開始も可)に開始すれば可とする。
- ⑤ 休薬基準: Gr3以上の非血液毒性 減量基準: Gr4の好中球減少 5日以上 Gr4以上の血小板減少
- ⑥ PEMBROの投与基準などは呼38を参照