

癌化学療法輸液約束処方 呼59

癌種 非小細胞肺癌
レジメン名 呼59 NIVO+IPI

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与時間	投与日	1クール期間
オプジーボ	ニボルマブ	NIVO	240 mg/body	div	30分	DAY 1,15,29	42日
ヤーボイ	イピリムマブ	IPI	1 mg/kg	div	30分	DAY 1	

[DAY 1]

- ① NS 50ml / 5分
- ② NS 100ml + オプジーボ 240 mg / 30分 ☆フィルター使用
- ③ NS 50ml / 5分
- ④ NS 50ml + ヤーボイ _____ mg / 30分 ☆フィルター使用 最終液量30mLに調製
- ⑤ NS 50ml / 5分

[DAY 15,29]

- ① NS 50ml / 5分
- ② NS 100ml + オプジーボ 240 mg / 30分
☆フィルター使用
- ③ NS 50ml / 5分

【注意事項】

- ・ヤーボイ:最終濃度1-4mg/mlに調製(最終液量を30mLとする) オプジーボ:30kg未満の患者の場合、最終液量100mLに調製
- ・投与開始前及び投与中にTSH、FT3、FT4などを定期的に測定。
- ・有害事象に対し副腎皮質ステロイドを投与する際に、HBVの再活性化に注意。
- ・パワーポート、BARD Xポート(シリコンカテーテル)使用不可

<休薬規定>

腎3を参照