

癌化学療法輸液約束処方 呼82

癌種 非小細胞肺癌(切除可能例への術前治療)
 レジメン名 呼82 CDDP+GEM+PEMBRO

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与時間	投与日	1クール期間
キイトルーダ	ペムブロリズマブ	PEM	200mg/body	div	30分	DAY 1	21日
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	75 mg/m ²		90分	DAY 1, 8	
ゲムシタビン	ゲムシタビン塩酸塩	GEM	1000 mg/m ²		30分		

[DAY 1,8]

メイン

- ① NS 50ml / 5分
- ② NS 100ml + キイトルーダ 200 mg / 30分 ☆フィルター使用
- ③ NS 500ml / 90分
- ④ NS 500ml + マグネゾール 20ml / 90分
- ⑤ NS 50ml + デキサート 1.5V / 5分
- ⑥ NS 50ml アロカリス1V + パロノセトロン1V / 30分
- ⑦ NS 100ml + ゲムシタビン mg / 30分
- ⑧ NS 100ml / 30分
- ⑨ NS 300ml + シスプラチン mg / 90分
- ⑩ マンニトール 300ml / 60分
- ⑪ NS 500ml / 90分
- ⑫ ソルデム3A 500ml / 90分

【 DAY 2,3 】

- ① NS 500ml + メトクロプラミド 2A / 90分
- ② NS 50ml + デキサート 1V / 15分
- ③ NS 500ml + メトクロプラミド 2A / 90分

【 DAY 8 】

- ① NS 100ml + グラニセトロン 1A / 10分
- ② NS 100ml + ゲムシタビン mg / 30分
- ③ NS 50ml / 5分

[備考]

クール制限:4クール

休薬基準:Gr3以上の非血液毒性

その他の休薬基準は呼38参照

減量基準:Gr4以上の血液毒性

R6.11.12作成