

## 癌化学療法輸液約束処方 子体13

癌種 子宮体癌  
 レジメン名 子体13 TC+Durv±Olaparib

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与時間	投与日	1クール期間
カルボプラチン	カルボプラチン	CBDCA	AUC 5	div	30分	DAY 1	21日間
パクリタキセル	パクリタキセル	PTX	175 mg/m <sup>2</sup>	div	180分		
イミフィンジ	デュルバルマブ	Durv	1120 mg/body	div	60分		
リムパーザ	オラパリブ	Ola	600 mg/body	p.o.	分2	DAY 1-21	

### [ DAY 1 ]

- ① NS 50ml / 5分
- ② NS 250ml + イミフィンジ 1120 mg / 60分 ☆フィルター使用
- ③ NS 50ml / 5分
- ④ NS 50ml + デキサート 3V + ファモチジン 1V / 5分 ☆投与開始時 レスタミン錠50mg内服
- ⑤ NS 50ml + パロノセトロン 1V + アロカリス1V / 30分
- ⑥ NS 500ml + パクリタキセル mg / 180分 ☆フィルター使用
- ⑦ NS 250ml + カルボプラチン mg / 60分
- ⑧ NS 50ml / 5分

### [ 備考 ]

- ① DULの投与基準は呼42参照
- ② 休薬基準: Gr3以上の非血液毒性 減量基準: Gr3の血液毒性
- ③ オラパリブの併用は主治医判断にて決定

R7.1.27作成