

## 癌化学療法輸液約束処方 乳17

癌種 乳癌  
 登録No. 乳17 HP+DOC(HPD)

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投薬期間	休薬期間	1クール期間
パージェタ	ペルツズマブ	PER	初回840mg,2回目以降420mg	div	DAY1	2週	3週
トラスツズマブ	トラスツズマブ	HER	初回8mg/kg,2回目以降6mg/kg	div	DAY1	2週	3週
ドセタキセル	ドセタキセル	DOC	75mg/m <sup>2</sup>	div	DAY1	2週	3週

### 【初回】

- ① NS 50ml / 5分 カロナール併用
- ② NS 250ml+ パージェタ 840 mg / 60分
- ③ NS 50ml / 5分
- ④ NS 250ml+ トラスツズマブ(8mg/kg) mg / 60分
- ⑤ NS 50ml / 5分
- ⑥ NS 100ml+デキサート 1V + アロキシ 1A / 10分
- ⑦ NS 250ml+ ドセタキセル \_\_\_\_\_ mg / 60分
- ⑧ NS50ml / 5分

### 【2回目以降】

- ① NS 50ml / 5分
- ② NS 250ml+ パージェタ 420 mg / 30分
- ③ NS 50ml / 5分
- ④ NS 100ml+ トラスツズマブ(6mg/kg) mg / 30分
- ⑤ NS 50ml / 5分
- ⑥ NS 100ml+デキサート 1V + アロキシ 1A / 10分
- ⑦ NS 250ml+ ドセタキセル \_\_\_\_\_ mg / 60分
- ⑧ NS50ml / 5分

- 【注意事項】**
- 1.フィルター(0.22 μm)を使用すること
  - 2.初回施行時カロナール錠併用(400mg以上が望ましい)