

癌化学療法約束処方 乳31術前①

癌種 早期高リスクのTN乳がん
 登録No. 乳31 術前① PEMBRO+PTX+CBDCA

| 薬品名(商品名) | 一般名 | 略号 | 標準投与量 | 投与経路 | 投薬期間 | 休薬期間 | 1クール期間 |
|----------|----------|--------|----------------------|------|------------|------|--------|
| キイトルーダ | ペムブロリズマブ | PEMBRO | 200mg | div | DAY 1 | 20日 | 21日 |
| パクリタキセル | パクリタキセル | PTX | 80 mg/m ² | div | DAY 1,8,15 | | |
| カルボプラチン | カルボプラチン | CBDCA | AUC 5 | div | DAY 1 | 20日 | |

【DAY 1】

- ① NS 50 ml / 5分
- ② NS 100 ml + キイトルーダ mg / 30分 ☆フィルター使用
- ③ NS 50 ml / 5分
- ④ NS 50 ml + デキサート 1V / 5分
- ⑤ NS 50 ml + ファモチジン 20mg + ポララミン 1A / 5分
- ⑥ NS 50 ml + アロキシ 1A / 30分
- ⑦ NS 250 ml + パクリタキセル mg / 1時間
- ⑧ NS 250 ml + カルボプラチン mg / 1時間
- ⑨ NS 50 ml / 5分

【DAY 8, 15】

- ① NS 50 ml + デキサート 1V / 5分
- ② NS 50 ml + ファモチジン 20mg + ポララミン 1A / 5分
- ③ NS 50 ml + グラニセトロン 1A / 30分
- ④ NS 250 ml + パクリタキセル mg / 1時間
- ⑤ NS 50 ml / 5分

【注意】インラインフィルター(0.22 μm)を使用

【備考】4コース

休薬基準: Grade2以上の血液毒性、非血液毒性→Grade1以下に回復するまで
 減量基準: 上記基準にて検討

R5.1.19作成