

## 癌化学療法輸液約束処方 乳31術前②

癌種 早期高リスクのTN乳がん

周術期投与期間要注意

登録No 乳31 術前② PEMBRO+EC

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投薬期間	休薬期間	1クール期間
キイトルーダ	ペムブロリズマブ	PEMBRO	200mg	div	DAY 1	20日	21日
塩酸エピルビシン	塩酸エピルビシン	EPI	90mg/m <sup>2</sup>	div	DAY1		
エンドキサン	シクロホスファミド	CPA	600mg/m <sup>2</sup>	div	DAY1		

- ① NS 50 ml / 5分
- ② NS 100 ml + キイトルーダ                      mg / 30分 ☆フィルター使用
- ③ NS 50 ml / 5分
- ④ NS50ml+デキサート1.5V+アロカリス 1V / 30分
- ⑤ NS50ml+アロキシ 1V / 5分
- ⑥ NS50ml+エピルビシン                      mg / 10分
- ⑦ NS100ml / 10分
- ⑧ NS250ml+エンドキサン                      mg / 30分
- ⑨ NS50ml / 5分

【注意】インラインフィルター(0.22 μm)を使用

【備考】4コース

休薬基準: Grade2以上の血液毒性、非血液毒性→Grade1以下に回復するまで

減量基準: 上記基準にて検討

R5.1.19作成