

## 癌化学療法輸液約束処方 乳34

癌種 乳癌  
登録No. 乳34 フェスゴ+wPTX

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投薬期間	休薬期間	1クール期間
フェスゴ	ペルツズマブ /トラスツズマブ		初回:IN	皮下	DAY1	2週	3週
			2コース目以降:MA				
パクリタキセル	パクリタキセル	PTX	80mg/m <sup>2</sup>	div	DAY1.8.15		

### 【DAY1】

- ① フェスゴ【IN】 / 8分かけて(初回)
- ① フェスゴ【MA】 / 8分かけて(2回目以降)
- ② NS 100ml+デキササート 1V+ファモチジン1V+ポラミン1A+グラニセトロン 1A / 30分
- ③ 5%G250ml+ パクリタキセル mg /60分 ☆フィルターあり
- ④ NS50ml / 5分

### 【DAY8.15】

- ① NS 100ml+デキササート 1V+ファモチジン1V+ポラミン1A+グラニセトロン 1A/30分
- ② 5%G250ml+ パクリタキセル mg /60分 ☆フィルターあり
- ③ NS50ml / 5分

- 【注意事項】
- 1.フィルター(0.22μm)を使用すること
  - 2.初回施行時カロナール錠併用(400mg以上が望ましい)
  - 3.フェスゴ投与は大腿部。投与後は初回30分、2回目以降15分の観察時間を要す
  - 4.6週間以上の間隔が空いた場合、INから再開が望ましい
  - 5.術前・術後補助化学療法としては計4回まで

【休薬基準】 血液毒性≥Grade3 非血液毒性≥Grade3  
 【減量基準】 血液毒性≥Grade2 非血液毒性≥Grade2

R7.1.31作成