

癌化学療法輸液約束処方 尿9

癌種 尿路上皮癌

レジメン名 尿9 dd-MVAC

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投薬期間	1クール期間
メトレキセート	メトレキサート	MTX	30mg/m ²	div	DAY 1	2週
エクザール	ビンブラスチン	VBL	3mg/m ²		DAY 2	
アドリアシン	ドキシソルビシン	ADM	30mg/m ²		DAY 2	
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	70mg/m ²		DAY 2	

DAY 1

- メイン ① ソルラクト 500 ml / 5時間
 側管 ② NS 100 ml + メトレキサート mg / 15分
 側管 ③ NS 50 ml / 5分

DAY 2

- ① NS 500 ml / 1.5時間
 ② NS 500 ml + マグネゾール 20ml / 1.5時間
 ③ NS 50 ml + デキサート 1.5V / 30分
 ④ NS 100 ml + パロノセトロン 1A + アロカリス 1V / 30分
 ⑤ NS 400 ml + シスプラチン mg / 2時間
 ⑥ マンニトール 150ml / 1時間
 ⑦ ソルラクト 500 ml / 2時間
 ⑧ NS 50 ml + エクザール mg / 15分
 ⑨ NS 50 ml + ドキシソルビシン mg / 30分
 ⑩ NS 50 ml / 5分

【備考】

- ①術前化学療法に用いる
 ②ジーラスタ併用
 ③総コース制限:4コース

【休薬規定】

PS \geq 2、好中球 $<$ 1500、PLT $<$ 10万、CCR $<$ 70min/mL、AST/ALT上昇 \geq Grade1、T-Bli \geq Grade1

【減量規定】

Grade3以上の血液毒性、非血液毒性

R6.7.26作成