

癌化学療法輸液約束処方 尿10

癌種 尿路上皮癌
 レジメン名 尿10 PADCEV+PEMBRO

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与時間	投与日	1クール期間
パドセブ	エンホルツマブ ベドチン	PAD	1.25 mg/kg (max125mg/body)	div	30分	DAY1,8	21日
キイトルーダ	ペムブロリズマブ	PEMBRO	200mg/body	div	30分	DAY 1	

[DAY 1]

- ① NS 50ml / 5分
- ② NS 50ml + パドセブ _____ mg / 30分
- ③ NS 50ml / 5分
- ② NS 100ml + キイトルーダ 200mg / 30分(フィルター使用)
- ③ NS 50ml / 5分

【PADCEV注意事項】

<調製方法>

1バイアルを注射用水3.3mLで溶解→10 mg/mL

<休薬規定>

Grade3以上の血液毒性・非血液毒性

<減量規定>

Grade2以上の血液毒性・非血液毒性

1.25(最大125mg)→1.0(最大100mg)→0.75(最大75mg)→0.5 mg/kg(最大50mg)

[DAY 8]

- ① NS 50ml / 5分
- ② NS 50ml + パドセブ _____ mg / 30分
- ③ NS 50ml / 5分

【PEMBRO注意事項】

尿3レジメン参照