

## 癌化学療法約束処方 卵巣21

癌種 卵巣癌  
登録No. 卵21 TC biweekly

薬品名 (商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投薬期間	休薬期間	1クール期間
パクリタキセル	パクリタキセル	PTX	120 mg/m <sup>2</sup>	div	DAY 1	13日	14日
カルボプラチン	カルボプラチン	CBDCA	AUC 3	div	DAY 1	13日	14日

### 【DAY 1】

- ① NS 100 ml + ファモチジン 20mg + デキサート 16 mg / 全開
- ② NS 50 ml + アロキシ 0.75 mg / 30分
- ③ NS 250 ml + パクリタキセル \_\_\_\_\_ mg / 2hr  
投与速度: 投与開始後15分間 62ml/hr 以降 125ml/hr
- ④ 5%Tz 100 ml + ネオファーゲンC 20 ml + タチオン 200mg / 全開
- ⑤ NS 250 ml + カルボプラチン \_\_\_\_\_ mg / 1hr
- ⑥ NS 50 ml / 全開

【注意】 ・上記①の際 レスタミン(10)5Tab 予薬  
・インラインフィルター(0.22 μm)を使用すること

【備考】 ・パクリタキセル滴下時、vital sign測定を頻回に

### 【パクリタキセル過敏症対策】

- ①投与速度 投与開始から15分は62ml/hrにて投与し、バイタル測定して問題なければ125ml/hrにアップする。  
速度変更15分後に再度バイタル測定し、患者の状態に変化がなければ終了まで同速で投与を行う。  
H27.6.15 女性診療科医局会にて決定

R1.9.6改訂