

## 癌化学療法約束処方 卵巣25

癌種 卵巣癌(プラチナ感受性再発)  
登録No. 卵25 Bv + GC

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与時間	投与経路	投与日	1コースの期間
ゲムシタビン	塩酸ゲムシタビン	GEM	1000 mg/m <sup>2</sup>	30 分	末梢	DAY 1, 8	21日
カルボプラチン	カルボプラチン	CBDCA	AUC 4	1 hr	末梢	DAY 1	
アバスチン	ベバシヅマブ	Bv	15mg/kg	90分→60分→30分	末梢	DAY 1	

### < DAY 1 >

- ① NS 50ml / 5分
- ② NS 100 ml + アバスチン \_\_\_\_\_ mg / (1コース目90分、2コース目60分、3コース目以降30分)
- ③ NS 50 ml + デキサート1V + アロキシ 0.75mg / 5分
- ④ NS 100 ml + ゲムシタビン \_\_\_\_\_ mg / 30分
- ⑤ NS 250 ml + カルボプラチン \_\_\_\_\_ mg / 1hr
- ⑥ NS 50 ml / 5分

Total 3hr.15min~2hr.15min

### < DAY 8 >

- ① NS 50 ml + デキサート1V + アロキシ 0.75mg / 5分
- ② NS 100 ml + ゲムシタビン \_\_\_\_\_ mg / 30分
- ③ NS 50 ml / 5分

Total 40min

### < 備考 >

- ① 6サイクル以降は アバスチン単剤とする(Bv+GCは最大6サイクルまで)。
- ② 本治療法はプラチナ感受性再発症例に対する2次治療のひとつである。

### 【アバスチンの休薬・中止基準】

- ①好中球数<1500/mm<sup>3</sup>, 血小板数<10万/mm<sup>3</sup>, 発熱38℃以上, Grade3以上の非血液毒性の発現時は中止。
- ②Grade2以上の高血圧(収縮期血圧>150mmHgまたは拡張期血圧>90mmHg):薬物治療を開始しコントロール可能となるまで休薬。  
G4未満の臨床症状を有する高血圧が、1週間以上継続する場合はアバスチンを中止。
- ③Grade3の蛋白尿:G2以下(UPC比<3.5)に回復するまで休薬。  
尿タンパクによる休薬が2ヶ月を超えた場合はアバスチンを中止。

H28.1.18改訂