

癌化学療法約束処方 卵巣31

癌種 卵巣癌
登録No. 卵31 PLD-C+Bev

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与時間	投与経路	投与日	1コースの期間
カルボプラチン	カルボプラチン	CBDCA	AUC=5	60分	末梢	DAY 1	28日
ドキシル	ドキシルビシン塩酸塩 リポソーム注射剤	PLD	30 mg/m ²	90分			
アバスチン	ベバシズマブ	Bev	10 mg/kg	90分～30分		DAY 1、15	

< DAY 1 > *フィルターなし

- ① 5%TZ 50 ml + デキサート1V / 5分
- ② 5%TZ 50 ml + アロキシ 0.75mg + アロカリス 235mg / 30分
- ③ 5%TZ 50 ml / 5分
- ④ 5%TZ 250 ml + ドキシル mg / 90分
- ⑤ 5%TZ 50 ml / 5分
- ⑥ NS 250 ml + カルボプラチン mg / 60分
- ⑦ NS 50 ml / 5分
- ⑧ NS 100 ml + アバスチン mg / 1回目90分 3回目以降30分
- ⑨ NS 50 ml / 5分

< DAY 15 > *フィルターなし

- ① NS 50 ml / 5分
- ② NS 100 ml + アバスチン mg / 2回目60分 3回目以降30分
- ③ NS 50 ml / 5分

< 備考 >

ドキシルに関する注意点は卵30を参照 6コースまで以降はアバスチン単剤で維持療法

【休薬基準】

- ①原発疾患の増悪または新病変の出現、2週間治療延期後 次サイクル開始基準へ抵触する場合
- ②下記のため、CBDCA AUC=4、PLD 25mg/m²後再び減量基準となった場合 ③非血液毒性Grade4

【減量基準】

白血球数または好中球数減少 Ggrade4が5日間、FN Grade3、血小板減少Grade4

T-bli ≥ 1.5または < 3.0 HFS Grade3 口腔粘膜炎 Grade3 その他の有害事象 Grade3 (ただし疲労、悪心・嘔吐、食欲不振は除く)