

癌化学療法輸液約束処方 大16

癌種 大腸癌 再発・切除不能（通院外来用） インフューザーポンプ使用

レジメン名 大16 FOLFIRI + C225

薬品名（商品名）	一般名	略号	標準投与量	投与時間	投与経路	投与日	1コースの期間
レボホリナート	レボホリナートCa	I-LV	200 mg/m ²	120分	末梢	DAY 1	14日間
イリノテカン	イリノテカン	CPT-11	150 mg/m ²	90分	CVポート	DAY 1	
フルオロウラシル	フルオロウラシル	5FU	400 mg/m ²	bolus iv		DAY 1	
フルオロウラシル	フルオロウラシル	5FU	1600~2400 mg/m ²	46hr civ		DAY 1	
アービタックス	セツキシマブ	C225	400 mg/m ² (1回目)	120分		DAY 1	
			250 mg/m ² (2回目以降)	60分		DAY 8	

DAY 1 (1回目入院)

【 CVポート 】

- ① NS 50ml + ポララミン 1A / 15分
- ② NS 50ml + デキサート 2V / 15分
- ③ **NS 500ml + アービタックス _____ mg / 120分**
※2回目以降は NS 250ml に希釈し 60分 投与
- ④ NS 50ml / 10分 ラインフラッシュ
- ⑤ NS 100ml / 60分 経過観察
- ⑥ NS 50ml + グラニセトロン 1A / 5分
- ⑦ NS 500ml + イリノテカン _____ mg / 90分
- ⑧ NS 50ml / 30分
- ⑨ NS 50ml + フルオロウラシル _____ mg / 5分
- ⑩ NS _____ ml + フルオロウラシル _____ mg / 計 _____ ml / 46hr civ
※ニプロシユアフューザー使用: SFS-1002D (100ml用)、SFS-5-25 (250ml用)
- ⑪ NS 20ml / シュアフューザー終了時フラッシュ

【 末梢 】

- ① 5%TZ 250ml + レボホリナート _____ mg / 120 ※⑦と同時に投与
- ② NS 50ml / 5分

DAY 8 (2回目以降)

【 CVポート 】

- ① NS 50ml + ポララミン 1A / 15分
- ② NS 50ml + デキサート 2V / 15分
- ③' **NS 250ml + アービタックス _____ mg / 60分**
- ④ NS 50ml / 10分 ラインフラッシュ
- ⑤ NS 100ml / 60分 経過観察

