

癌化学療法輸液約束処方 大21

癌種 大腸癌 再発・切除不能（通院外来用）

レジメン名 大21 XELOX + BV

薬品名（商品名）	一般名	略号	標準投与量	投与方法	投与経路	投与日	1コースの期間
アバスタチン	ベバシズマブ	BV	7.5 mg/kg	1コース目: 90min	CVポート または 末梢	DAY 1	21日間
				2コース目: 60min			
				3コース目以降: 30min			
エルプラット	オキザリプラチン	L-OHP	130 mg/m ²	120min			
カペシタビン	カペシタビン	-	体表面積 1.36m ² 未満	1日用量 2400mg (8錠)	分2 朝夕食後	PO	DAY 1(夕)~15(朝) または DAY 1(朝)~14(夕)
			1.36m ² 以上1.66m ² 未満	1日用量 3000mg (10錠)			
			1.66m ² 以上1.96m ² 未満	1日用量 3600mg (12錠)			
			1.96m ² 以上	1日用量 4200mg (14錠)			

※実施決定後より内服開始

DAY 1

- ① NS 50ml / 5min
- ② NS 100ml + アバスタチン mg / (1コース目: 90min、2コース目: 60min、3コース目以降: 30min)
- ③ NS 50ml / 5min
- ④ 5%Tz 50ml + デキサート 1V / 5min
- ⑤ 5%Tz 50ml + グラニセトロン 1A / 5min
- ⑥ 5%Tz 500ml + エルプラット mg / 120min
- ⑦ 5%Tz 50ml / 5min
- ⑧ NS 20ml / フラッシュ

total. 175min~235min

* 注意事項

投与量はC法を適用する

XELOX + BV療法の用法・用量、休薬・減量・再開については別紙参照とする。

R6.10.28改訂